

OCUhydC[®]

(Natrlijum-hijaluronat 1.2 mg/mL)

Kapi za vlaženje i negu oka

1. Šta je OCUhydC[®] i za šta se upotrebljava

OCUhydC[®] su sterilne kapi za oči koje smiruju osetljive oči, imaju efekat vlaženja i osobine lubrikansa. S obzirom da sadrže hijaluronsku kiselinu (supstanca koja se uobičajeno nalazi u telu i oku), ove kapi za oči veoma efikasno i dugotrajno otklanjaju osećaj suvoće oka peckanja i umora oka. **OCUhydC[®]** kapi su obogaćene prirodnim ekstraktom nevena koji obezbeđuje zaštitu od iritacije oka i pozitivno deluje na regeneraciju epitela oka. **OCUhydC[®]** ne sadrži konzervante ni antimikrobne supstance. Zbog toga su ove kapi namenjene i osobama koje imaju osetljive oči ili koje nose kontaktna sočiva.

OCUhydC[®] mogu da koriste odrasli, adolescenti i deca.

OCUhydC[®] je preparat namenjen za okularnu upotrebu. Koristi se kao dopunska terapija kod smanjenog lučenja suza, osećaja stranog tela u oku, umora i iritacije oka. Takođe se koristi kao podrška terapiji poremećaja proizvodnje zaštitnog suznog filma na rožnjači i konjuktivi oka. **OCUhydC[®]** može da se upotrebljava dok nosite meka kontktna sočiva.

2. Šta treba da znate pre nego što upotrebite OCUhydC[®]

OCUhydC[®] ne sme da se koristi u slučaju preosetljivosti na pojedine komponente proizvoda.

Ukoliko koristite istovremeno i druge kapi za oči, preporučuje se najmanje 5 minuta između primene drugih preparata za oči i preparata **OCUhydC[®]**. Ukoliko koristite i druge lekove ili planirate da započnete terapiju lekom čiji je režim propisivanja uz recept ili bez recepta, porazgovarajte sa svojim lekarom. Takođe, ukoliko koristite druge lekove za okularnu primenu konsultujte se sa oftalmologom o podesnosti njihove istovremene upotrebe.

3. Kako da koristite OCUhydC[®]

Doziranje: Ukoliko vam lekar ne propiše drugačije doziranje je uobičajeno - ukapava se u konjunktivalnu kesu 1 kap 1-3 puta dnevno. Po potrebi mogu da se koriste češće. Doziranje za decu je individualno i propisuje ga lekar.

Proizvod mogu da koriste odrasli, adolescenti i deca.

Način primene:

Preparat je namenjen okularnoj upotrebi po otvaranju.



1. Otpakujte plastičnu bočicu sa OSD zatvaračem - sa sistemom za kapanje pritiskom na bočicu.



2. Pre prve primene uklonite zaštitnu traku sa OSD zatvarača.



3. Odvrnite poklopac sa OSD zatvarača.



4. Nagnite blago glavu unazad. Okrenite bočicu na dole. Držite bočicu između palca i ostalih prstiju. Prstom lagano povucite donji kapak na dole i ukapajte propisani broj kapi u donju konjunktivalnu kesicu pritiskajući plastičnu bočicu. Pazite da vrh bočice ne dodirne oko ili trepavice. Lagano zatvorite oko da bi se **OCUhydC[®]** ravnomerno rasporedio po površini oka.



Prilikom primene pazite da kapaljka ne dodiruje oko ni očne kapke. Posle primene zavrnite čvrsto poklopac da bi se izbegla kontaminacija. Boćica se čuva u uspravnom položaju.

Upozorenje prilikom upotrebe:

Preporučuje se da pre prve upotrebe odbacite prvu kap koju istisnete iz boćice. Moguće je da iz boćice izade mlaz ako je pritisnate snažno i neuvedenočeno. Svaki put kada pritisnete plastičnu boćicu samo ćete istisnuti jednu kap rastvora **OCUhy/C®**. Da biste omogućili da izade sledeća kap dozvolite da vazduh uđe u boćicu i vrati joj prvobitni oblik pa nastavite po preporučenom načinu primene.

Neposredno po primeni, može se javiti zamućen vid, koji može umanjiti sposobnost upravljanja motornim vozilom i rada na mašinama. Zbog toga se ne preporučuje da se obavlaju ove aktivnosti najmanje 20 minuta posle primene ovih kapi.

U slučaju da kapi slučajno progutaju deca javite se odmah vašem pedijatru.

4. Mogući neželjeni efekti

Retko se može javiti blag, prolazan osećaj peckanja odmah nakon upotrebe. Moguće su i alergijske reakcije.

U slučaju eventualne pojave ovih ili neuobičajenih reakcija javite se vašem oftalmologu.

5. Šta OCUhy/C® sadrži

natrijum-hijaluronat 1,2 mg u 1 mL rastvora;

Pomoćne supstance: ekstrakt nevena; natrijum-hlorid; kalijum-hlorid; kalcijum-hlorid, dihidrat; magnezijum-hlorid, heksahidrat; natrijum-acetat, trihidrat; natrijum-citratvoda za injekcije;

6. Kako da čuvate OCUhy/C® i ostale informacije

Čuvati na temperaturi do 25°C. Ne čuvati u frižideru/ne zamrzavati. Proizvod se ne sme koristiti posle isteka roka trajanja označenog na pakovanju ili na kartonskoj kutiji pored simbola peščanog sata. Datum isteka roka je poslednji dan navedenog meseca.

Posle prvog otvaranja originalnog pakovanja proizvod može da se koristi najduže 3 meseca.

Pakovanje: 1 x 10 mL



UNIMED PHARMA, spol.s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovačka

Nosilac upisa u Registar medicinskih sredstava Srbije:

PREDSTAVNIŠTVO UNIMED PHARMA s.r.o., Španskih boraca 22b, Beograd, Srbija

2265

STERILE A

Datum poslednje revizije teksta: Oktobar 2016

Broj Rešenja: 515-02-03271-16-001 od 14.03.2017.